

7^ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



ΕΛ.Ε.ΨΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ



Στο 7^ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας
χορηγούνται 23 Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)
από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο

12 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΣΠΕΤΣΕΣ

Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών



ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ONE TO ONE A.E.

Tel: +30 210 7204303-305-306 Fax: +30 210 7204304 E-mail: info@one2one.gr

Website: www.one2one.gr / www.one2one.gr



Escitalopram/ Actavis®

10, 20mg/tab x 28

Εργαζόμαστε

για την Εύα

προσφέροντας ποιοτικές,
οικονομικές και προσιτές
θεραπευτικές λύσεις
για τις συναισθηματικές
διαταραχές



Specifar

A Teva Company

28^η Οκτωβρίου 1, Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα, ΤΚ: 123 51,
Τηλ.: 210 54 01 500, Fax: 210 54 01 600, info@specifar.gr

www.specifar.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.), στοχεύοντας πάντα στη σωστή δια βίου εκπαίδευση των Ελλήνων ψυχιάτρων, διοργανώνει το ετήσιό της συνέδριο στις Σπέτσες, σε ένα ιστορικό νησί, που η ενδιαφέρουσα παραδοσιακή του αρχιτεκτονική συνυπάρχει με τις μυρωδιές της φύσης, δίνοντάς του τον χαρακτηρισμό «Νησί των Αρωμάτων».

Σκοπός του συνεδρίου μας είναι να ανιχνεύσουμε, στο βαθμό του δυνατού, τα δύσβατα μονοπάτια της ψυχιατρικής θεραπευτικής και να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σε καίρια, κυρίως πρακτικά θέματα που μας αφορούν, αναβαθμίζοντας έτσι τις γνώσεις μας, με ό,τι σύγχρονο υπάρχει στο διεθνή ορίζοντα.

Στο συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συμμετέχουν όχι μόνο καταξιωμένοι στο χώρο μας Έλληνες ψυχίατροι, αλλά και διακεκριμένοι εγνωσμένης αξίας ξένοι καθηγητές Πανεπιστημίων, με βαθιά γνώση του αντικειμένου που θα μας αναπτύξουν.

Σε μια εποχή, αγαπητοί συνάδελφοι, που η ψυχοφαρμακολογική έρευνα διεισδύει όλο και περισσότερο στο μέχρι προ ολίγων ετών άβατο της μοριακής βιολογίας και γενετικής και οι προβληματισμοί που αφορούν τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων διαδέχονται ο ένας τον άλλον, οι ψυχίατροι καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε πολλά και σοβαρά διλήμματα που έχουν σχέση με τη φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών τους. Διερωτάται λοιπόν κανείς, αν στην άσκηση της καθημερινής ψυχιατρικής, θα πρέπει να υιοθετηθούν κάποιες από τις κλασικές και πετυχημένες στο παρελθόν θεραπευτικές πρακτικές ή αν θα πρέπει να προσεγγίσουμε νέες καινοτόμες και πρωτοπόρες θεραπευτικές λύσεις που προσφέρονται τόσο από τη φαρμακευτική βιομηχανία, όσο και από τη διαχρονική εξέλιξη εφαρμοσμένων θεραπευτικών μοντέλων.

Στα διλήμματα αυτά, θα πρέπει να δοθούν κατά το δυνατόν απαντήσεις στο συνέδριο μας, που να ικανοποιούν όχι μόνο τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και τους αποδέκτες των θεραπειών, δηλαδή τους ασθενείς.

Προσδοκώντας λοιπόν σε ένα ακόμη πετυχημένο συνεδριακό τριήμερο, η ΕΛ.Ε.ΨΥ., σας καλεί όλους να έχετε ενεργό παρουσία και συμμετοχή, σε ένα συνέδριο υψηλού επιστημονικού επιπέδου που κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει θεσμός στο χώρο της ψυχιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής



Ιωάννης Χατζημανώλης

7⁰ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

14.00 - 15.00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15.00 - 16.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Άγχος και κατάθλιψη:
Συνέπεια ή αποτέλεσμα;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Παπαγεωργίου, Π. Φερεντίνος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γ. Παπαγεωργίου

Νευροβιολογία των αγχωδών διαταραχών και των διαταραχών της διάθεσης.

Π. Φερεντίνος

Αγχώδης κατάθλιψη: Κλινικά χαρακτηριστικά και θεραπευτικές επιλογές.

Α. Σπυροπούλου

Η πορεία και η θεραπεία των αγχωδών διαταραχών στις γυναίκες.

16.30 - 18.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Διαταραχές της διάθεσης στην τρίτη ηλικία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Α. Πολίτης, Γ. Πετρίδης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ε. Κατιρτζόγλου

Προβληματισμοί στη φαρμακευτική θεραπεία της γηριατρικής κατάθλιψης.

Γ. Πετρίδης

Η ECT στη θεραπεία της γηριατρικής κατάθλιψης.

Α. Πολίτης

Η διπολική διαταραχή στην τρίτη ηλικία.

18.00 - 18.45

ΔΙΑΛΕΞΗ

Η ρύθμιση πρόσληψης τροφής, τα συστήματα ανταμοιβής
και ο ρόλος της ντοπαμίνης και των οπιοειδών.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Αλεβιζόπουλος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Χ. Λιάπης

Ναλτρεξόνη HCl 32mg / Βουπροπιόνη HCl 360mg: Η αξία του διπλού μηχανισμού δράσης στη μείωση του σωματικού βάρους.

Μ. Νυσταζάκη

Ο ρόλος της κινητοποίησης στην έκβαση του υπέρβαρου/παχύσαρκου ψυχικά πάσχοντα.

Χορηγός: VALEANT

18.45 - 19.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

THURSDAY, APRIL 12, 2018

14.00 - 15.00

ATTENDEE'S REGISTRATION

15.00 - 16.30
SYMPOSIUM

Anxiety and depression:
Cause or effect?

CHAIRS

G. Papageorgiou, P. Ferentinos

SPEAKERS

G. Papageorgiou

Neurobiology of Anxiety and Mood disorders.

P. Ferentinos

Anxious Depression: Clinical characteristics and treatment options.

A. Spyropoulou

The course and treatment of anxiety disorders in women.

16.30 - 18.00

SYMPOSIUM

Mood disorders in late-life.

CHAIRS

A. Politis G. Petridis

SPEAKERS

E. Katirtzoglou

Therapeutic considerations in treating depression in the elderly.

G. Petridis

ECT in geriatric depression.

A. Politis

Bipolar Disorders in late-life.

18.00 - 18.45

LECTURE

Adjustment of food intake, reward systems
and the role of dopamine and opioids.

CHAIR

G. Alevizopoulos

SPEAKERS

Ch. Liapis

Naltrexone HCl 32mg / Bupropion HCl 360mg: The value of the dual mechanism of action in reducing body weight.

M. Nistazaki

The role of motivation in the therapy outcome in overweight / obese suffers mental disorder.

Sponsored by VALEANT

18.45 - 19.15

COFFEE BREAK • VISIT TO THE EXHIBITION AREA



ΠΕΜΠΤΗ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

19.15 - 20.00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πολυτροπικός μηχανισμός δράσης για τη θεραπεία της κατάθλιψης.
Ο ρόλος της τραζοδόνης παρατεταμένης αποδέσμευσης.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Δ. Δικαίος

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Π. Φερεντίνος

Χορηγός: **ANGELINI PHARMA HELLAS SA**

20.00 - 20.15

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛ.Ε.ΨΥ.

Ι. Χατζημανώλης

20.15 - 21.00

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

To nosebo στην κλινική πράξη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Παπαδημητρίου

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Π. Σφηκάκης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1^{ης} ΗΜΕΡΑΣ



HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

THURSDAY, APRIL 12, 2018

19.15 - 20.00

LECTURE

Multimodal mechanism of action for the treatment of depression.
The role of trazodone extended release.

CHAIR

D. Dikeos

SPEAKER

P. Ferentinos

Sponsored by **ANGELINI PHARMA HELLAS SA**

20.00 - 20.15

PRESIDENTIAL
ADDRESS

PRESIDENTIAL ADDRESS

I. Chatzimanolis

20.15 - 21.00

OPENING
LECTURE

The nosebo in clinical practice.

CHAIR

G. Papadimitriou

SPEAKER

P. Sfikakis

END OF THE 1ST DAY PROGRAM



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

8.30 - 10.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ	<u>Σκέψεις και θεραπευτικές επιλογές που αφορούν τη σχιζοφρένεια.</u> ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Ν. Σμυρνής, Χ. Τουλούμης ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ν. Σμυρνής Δομικές και λειτουργικές εγκεφαλικές αλλαγές ως αποτέλεσμα των φαρμακευτικών παρεμβάσεων στη σχιζοφρένεια. Θ. Μουγιάκος Η φαρμακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας: Τι πρέπει να γνωρίζουμε και προς τα πού οδηγούμεθα. Χ. Τουλούμης Οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την πολυφαρμακία των αντιψυχωσικών: Κλινική σημασία και αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων.
10.00 - 10.45 ΔΙΑΛΕΞΗ	<u>Παλμιτική παλιπεριδόνη: σχεδιάζοντας το νέο θεραπευτικό μοντέλο στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας.</u> ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Θ. Μουγιάκος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Θ. Μουγιάκος Προσεγγίζοντας τα νεότερα θεραπευτικά δεδομένα. ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ρ. Ψαράς Οι θεραπείες μακράς δράσης από τη σκοπιά του νέου ψυχιάτρου. Σ. Καραουλάνης Ορίζοντας το θεραπευτικό μονοπάτι της παλμιτικής παλιπεριδόνης. Χορηγός: JANSSEN - CILAG PHARMACEUTICAL SACI
10.45 - 11.15 ΔΙΑΛΕΞΗ	<u>Η Ηλεκτροσπασμοθεραπεία και άλλες τεχνικές εγκεφαλικής διέγερσης στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.</u> ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ. Παπαδημητρίου ΟΜΙΛΗΤΗΣ Γ. Πετρίδης
11.15 - 11.45	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
11.45	ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΠΕΤΣΩΝ



HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

FRIDAY, APRIL 13, 2018

DAY DEDICATED TO SCHIZOPHRENIA

8.30 - 10.00

SYMPOSIUM

Thoughts and therapy choices regarding schizophrenia.

CHAIRS

N. Smyrnis, Ch. Touloumis

SPEAKERS

N. Smyrnis

Structural and functional brain changes as a result of pharmacological interventions in schizophrenia.

Th. Mougiakos

Pharmacotherapy in schizophrenia.

What we need to know and what we are lead towards.

Ch. Touloumis

The risks and benefits of the polypharmacy of antipsychotics: Clinical importance and use of the evidence.

10.00 - 10.45

LECTURE

Paliperidone Palmitate: shaping a new treatment paradigm
in schizophrenia.

CHAIR

Th. Mougiakos

INTRODUCTION

Th. Mougiakos

Overview of the latest therapeutic data.

SPEAKERS

R. Psaras

Long acting treatments: a young psychiatrist's perspective.

S. Karaoulanis

Defining the treatment pathway of paliperidone palmitate.

Sponsored by **JANSSEN - CILAG PHARMACEUTICAL SACI**

10.45 - 11.15

LECTURE

ECT and other brain stimulation techniques
in the treatment of schizophrenia.

CHAIR

G. Papadimitrou

SPEAKER

G. Petridis

11.15 - 11.45

COFFEE BREAK • VISIT TO THE EXHIBITION AREA

11.45

TRANSITION TO KAPODISTRIAN CONVENTION CENTER



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

12.15 - 13.45

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Στην
Καποδιστριακή
Στέγη Σπετσών

Διαγνωστικοί δείκτες και φαρμακολογικές παρεμβάσεις
σε πρώιμα στάδια της ψύχωσης.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

N. Στεφανής, J. Kane

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ch. Pantelis

Markers of neuroinflammation across stages of psychosis: data in high-risk for psychosis, first-episode psychosis and chronic schizophrenia.

P. McGorry

Using antipsychotic meds more carefully and strategically in early psychosis.

N. Στεφανής

The First Episode Psychosis project in Athens: First results.

13.45 - 14.30

LECTURE

The necessity of improving and protecting functionality in patients suffering
from schizophrenia, early in the disease course - why and how?

CHAIRS

D. Dimellis, D. Stogiorgiou

SPEAKER

J. Perez

Sponsored by LUNDBECK HELLAS SA

14.30 - 17.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ



HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

FRIDAY, APRIL 13, 2018

DAY DEDICATED TO SCHIZOPHRENIA

12.15 - 13.45

SYMPOSIUM

Kapodistrian
Convention
Center

Predictive markers and pharmacological interventions
in early stages of psychosis.

CHAIRS

N. Stefanis, J. Kane

SPEAKERS

Ch. Pantelis

Markers of neuroinflammation across stages of psychosis: data in high-risk for psychosis, first-episode psychosis and chronic schizophrenia.

P. McGorry

Using antipsychotic meds more carefully and strategically in early psychosis.

N. Stefanis

The First Episode Psychosis project in Athens: First results.

13.45 - 14.30

LECTURE

The necessity of improving and protecting functionality in patients suffering
from schizophrenia, early in the disease course - why and how?

CHAIRS

D. Dimellis, D. Stogioglou

SPEAKER

J. Perez

Sponsored by LUNDBECK HELLAS SA

14.30 - 17.00

LIGHT LUNCH

7⁰ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ

17.00 - 17.45

ΔΙΑΛΕΞΗ

Μακράς διάρκειας αντιψυχωτικά στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.
Σε ποιον ασθενή και γιατί;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Αλεβιζόπουλος

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Β. Μποζίκας

Χορηγός: PHARMASERVE - LILLY S.A.C.I.

17.45 - 18.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

The Role of Social Media and the Internet
in Reducing the Duration of Untreated Psychosis.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Πετρίδης

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

J. Kane

18.30 - 19.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Early Intervention in Psychiatry - New concepts and new cultures of care.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ν. Στεφανής

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

P. McGorry

19.15 - 19.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

19.45 - 20.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Trajectories of brain change in psychosis: 'Risk' and 'resilience' factors
during emergence and relapse of illness.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Β. Μαυρέας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ch. Pantelis

20.30 - 21.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Treatment Resistant Schizophrenia: Quo Vadis?

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ν. Στεφανής

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

J. KaneΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2^{ΗΣ} ΗΜΕΡΑΣ

FRIDAY, APRIL 13, 2018

DAY DEDICATED TO SCHIZOPHRENIA

17.00 - 17.45

LECTURE

Long acting antipsychotics in the treatment of schizophrenia.
To whom and why?

CHAIR

G. Alevizopoulos

SPEAKER

V. Bozikas

Sponsored by PHARMASERVE - LILLY S.A.C.I.

17.45 - 18.30

LECTURE

The Role of Social Media and the Internet
in Reducing the Duration of Untreated Psychosis.

CHAIR

G. Petridis

SPEAKER

J. Kane

18.30 - 19.15

LECTURE

Early Intervention in Psychiatry - New concepts and new cultures of care.

CHAIR

N. Stefanis

SPEAKER

P. McGorry

19.15 - 19.45

COFFEE BREAK • VISIT TO THE EXHIBITION AREA

19.45 - 20.30

LECTURE

Trajectories of brain change in psychosis: 'Risk' and 'resilience' factors
during emergence and relapse of illness.

CHAIR

V. Mavreas

SPEAKER

Ch. Pantelis

20.30 - 21.15

LECTURE

Treatment Resistant Schizophrenia: Quo Vadis?

CHAIR

N. Stefanis

SPEAKER

J. Kane



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΩΡΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

08:30 - 10:00

ΚΛΙΝΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
“Meet the experts”

ΑΙΘΟΥΣΑ (Α)

Σοβαρές θεραπευτικές
προκλήσεις στην
ψυχιατρική πρακτική:
Όψιμη Δυσκινησία
και Ινομυαλγία.

Χ. Τουλούμης
Δ. Ρούκας

ΑΙΘΟΥΣΑ (Β)

Η ευελιξία
της κουετιαπίνης
στο φάσμα των
ψυχιατρικών
διαταραχών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Γ. Αλεβιζόπουλος


ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Θ. Μουγιάκος

Χορηγός
ELPEN A.E.

ΑΙΘΟΥΣΑ (C)

Άνοιες:
Διαφοροδιαγνωστικοί
και θεραπευτικοί
προβληματισμοί.

Α. Πολίτης
Ε. Κατιρτζόγλου





7th

HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

SATURDAY, APRIL 14, 2018

08:30 - 10:00

WORKSHOP
“Meet the experts”

TREATMENT ROOM(A)

Serious therapeutic challenges in psychiatric practice: tardive dyskinesia and fibromyalgia.

Ch. Touloumis
D. Roukas

CLINICAL ROOM (B)

The flexibility of quetiapine in the spectrum of psychiatric disorders.

CHAIR
G. Alevizopoulos


SPEAKER
Th. Mougialkos

Sponsored by
ELPEN A.E.

EDUCATIONAL ROOM (C)

Dementias: diaforodiagnostic and therapeutic considerations.

A. Politis
E. Katirtzoglou



ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

10.00 - 11.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Νέες εξελίξεις στην ψυχιατρική έρευνα και στην κλινική πρακτική:
Από τη θεωρία στην πράξη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Δ. Δικαίος, Γ. Αλεβιζόπουλος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δ. Δημέλλης

Το μέλλον της έρευνας στη σχιζοφρένεια.

Δ. Δικαίος

Το μέλλον της έρευνας στην κατάθλιψη.

Γ. Αλεβιζόπουλος

Η ορθή κλινική πρακτική (GCP) στις κλινικές μελέτες νέων φαρμάκων.

11.30 - 12.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λειτουργική αποκατάσταση και επίτευξη ύφεσης στη θεραπεία της κατάθλιψης.
Η θέση της αγομελατίνης.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ι. Χατζημανώλης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δ. ΡούκαςΧορηγός: **SERVIER HELLAS**

12.15 - 12.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

12.45 - 13.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο ρόλος της Per os παλμιπεριδόνης στη θεραπεία της σχιζοφρένειας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Παπαγεωργίου

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Θ. ΜουγιάκοςΧορηγός: **VIANEX SA**

13.30 - 14.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

The treatment of depression is evolving.
Patients feel, think and do better.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Δ. Ρούκας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ph. FossatiΧορηγός: **LUNDBECK HELLAS SA**

14.15 - 17.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ



HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

SATURDAY, APRIL 14, 2018

10.00 - 11.30

SYMPOSIUM

New developments in psychiatry research and clinical practice:
From theory to practice.

CHAIRS

D. Dikeos, G. Alevizopoulos

SPEAKERS

D. Dimellis

The future of schizophrenia research.

D. Dikeos

The future of depression research.

G. Alevizopoulos

Global clinical practice in the clinical research of new drugs.

11.30 - 12.15

LECTURE

Functional recovery and attainment of remission in the treatment of depression.
The position of agomelatine.

CHAIR

I. Chatzimanolis

SPEAKER

D. Roukas

Sponsored by **SERVIER HELLAS**

12.15 - 12.45

COFFEE BREAK • VISIT TO THE EXHIBITION AREA

12.45 - 13.30

LECTURE

The role of paliperidone ER in the treatment of schizophrenia.

CHAIR

G. Papageorgiou

SPEAKER

Th. Mougias

Sponsored by **VIANEX SA**

13.30 - 14.15

LECTURE

The treatment of depression is evolving
Patients feel, think and do better.

CHAIR

D. Roukas

SPEAKER

Ph. Fossati

Sponsored by **LUNDBECK HELLAS SA**

14.15 - 17.00

LIGHT LUNCH



ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

14:30 - 15:30

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Με δήλωση
συμμετοχής

Γνωρίστε το deprexis.
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμπλέξει ενεργά
τον ασθενή στην θεραπεία της κατάθλιψης;

Ρ. Ψαράς

Χορηγός: **SERVIER HELLAS**

17.00 - 18.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Ψυχιατρικά προβλήματα και η αντιμετώπισή τους σε γυναίκες
της αναπαραγωγικής ηλικίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Παπαγεωργίου, Α. Σπυροπούλου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Λεονάρδου

Προεμμηνορυσιακή δυσφορική διαταραχή: Διάγνωση και θεραπεία.

Α. Σπυροπούλου

Ψύχωση κατά την κύηση και τη λοχεία: Ένα θεραπευτικό δίλημμα.

Ν. Κόκρας

Η χρήση των SSRIs και των βενζοδιαζεπινών κατά τη διάρκεια της κύησης:
Νεότερα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα.

18.30 - 19.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Σύγχρονοι προβληματισμοί στην προφυλακτική
αντιψυχωσική θεραπεία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ι. Χατζημανώλης

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ν. Στεφανής

Χορηγός: **GAP A.E.**

19.15 - 19.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



SATURDAY, APRIL 14, 2018

14:30 - 15:30

WORKSHOP

Registration
is required

Meet deprexis.

How artificial intelligence can actively involve
the patient in the treatment of depression?

R. Psaras

Sponsored by **SERVIER HELLAS**

17.00 - 18.30

SYMPOSIUM

Psychiatric problems and dealing with them
in women of reproductive age.

CHAIR

G. Papageorgiou, A. Spyropoulou

SPEAKERS

A. Leonardou

Premenstrual dysphoric disorder: Diagnosis and therapy.

A. Spyropoulou

Psychosis during pregnancy and the postpartum period: A therapeutic dilemma.

N. Kokras

The use of SSRI's and of benzodiazepines during pregnancy:
New clinical and research findings.

18.30 - 19.15

LECTURE

Challenges involved in the prophylactic use
of antipsychotic medication.

CHAIR

I. Chatzimanolis

SPEAKER

N. Stefanis

Sponsored by **GAP S.A.**

19.15 - 19.45

COFFEE BREAK • VISIT TO THE EXHIBITION AREA



ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

19.45 - 20.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ακολουθώντας νέους δρόμους στην αντιμετώπιση
του γενικευμένου άγχους.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Δ. Δικαίος

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Δ. Δημέλλης

Χορηγός: **PFIZER HELLAS A.E.**

20.30 - 21.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση:
Ρεαλισμός ή ουτοπία;


ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ι. Νηματούδης

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ν. Στεφανής

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ





7th

HELLENIC SOCIETY FOR CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

SATURDAY, APRIL 14, 2018

19.45 - 20.30

LECTURE

CHAIR

D. Dikeos

SPEAKER

D. Dimellis

Following new pathways for the treatment of GAD.

Sponsored by **PFIZER HELLAS S.A.**

20.30 - 21.15

LECTURE

CHAIR


I. Nimatoudis

SPEAKER

N. Stefanis

Early Intervention in Psychosis:
A future challenge for our Mental Health Services.

CLOSE OF CONGRESS





XEPLION®
παλμιτική παλιπεριδόνη



TREVICTA®
paliperidone palmitate
ενέσιμο διάλυμα παρατεταμένης αποδέσμευσης

[illegible]

KTK TM KEM Y EP

00000000000000000000	P00000000 0000000000000000	A00 0 0000 00	0000 00 00
000 . 00	0000 00 00 00 00000000	192,860	25050
100 0 . 00	0000 00 00 000 00000000	2000	0000
150 00 00	0000 00 0005 0000 00000000	06.080	01 00

151 21 8000. Πιν. 210 80.90.000.

KTK TMKEM YEP

XXXXXXXXXXXX	PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	A00 0 XXXXX	XXXX 00 XXXX
26/00 00 00	XXXX 00 000000 XXXXXXX	58,08 00	79,20
50 00 00 00	XXXX 00 000000 XXXXXXX	11,02 00	892,00
525/00 00 00	XXXX 00 0025 000 XXXXXXX	1.065,50 00	1.09,21 00

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF *Johnson & Johnson*

PHGR/TRE/0318/0011

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ph. Fossati

Professor of Psychiatry, MD, Pitié-Salpêtrière Hospital & University Pierre & Marie Curie, Paris VI, France

J. M. Kane

MD, Professor of Psychiatry, Neurology and Neuroscience. President for Behavioral Health Services of Northwell Health and Chairman of Psychiatry at The Zucker Hillside Hospital

P. McGorry

Professor of Youth Mental Health at the University of Melbourne and Director of Orygen Youth Health and Orygen Youth Health Research Centre in Victoria, Australia

Ch. Pantelis

Professor of Neuropsychiatry & Scientific Director of Melbourne Neuropsychiatry Centre at The University of Melbourne

J. Perez

Professor MD, PhD, CAMEO, Early Intervention Service Department of Psychiatry. University of Cambridge, UK

Γ. Αλεβιζόπουλος

Ψυχίατρος, MD, PharmD, PhD, DFP, MAPA Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Ψυχιατρικό Τμήμα Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Δ. Δημέλλης

MD, PhD Ψυχίατρος, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «Ego Ideal»

Δ. Δικαίος

Καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Σ. Καραουλάνης

Επιμελητής Α' Ψυχιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Ε. Κατιρτζόγλου

Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Ν. Κόκρας

Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Ψυχιατρικής Κλινικής & Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. Λεονάρδου

M.D., Dr., Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γραμματέας Κλάδου Ψυχικής Υγείας Γυναικών και Ψυχιατρικής της Αναπαραγωγής της Ε.Ψ.Ε.

Χ. Λιάπης

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Β. Μαυρέας

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θ. Μουγιάκος

Αρχίατρος - Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής 414 ΣΝΕΝ

Β. Μποζίκας

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής

Ι. Νηματούδης

Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Κλινικής

Μ. Νυσταζάκη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

LAZAP[®]

Olanzapine

Στην σχιζοφρένεια
& τη διπολική διαταραχή



NEO

Για τη νόσο Alzheimer

EBIMEM[®]

Memantine Hydrochloride

PENEZIL[®]

Donepezil Hydrochloride

Για τη νόσο Alzheimer



NEO

Για τη νόσο Alzheimer

RIVASET[®]

Rivastigmine 2mg/ml



VAROM[®]

Citalopram
(ως Citalopram Hydromide)

Στην κατάθλιψη...
& τις αγχώδεις διαταραχές



Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας



Δερβενακίων 38, 153 44 Γέρακας Αττικής
τηλ.: 210 6393944, fax: 210 6619944

Συν-παιώνισμα



BRAIN
THERAPEUTICS
FOCUS ON CNS

Επιστησίου 8, 16341 Ηλιούπολη
τηλ.: 210 9931458,
info@braintherapeutics.gr

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γ. Παπαγεωργίου

Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος ΚΚΨΥ Παγκρατίου, Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»

Γ. Παπαδημητρίου

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Κολλεγίου Εκπαίδευσης, Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας Ψυχιατρικών Διαταραχών

Γ. Πετρίδης

Director, Division of ECT, «The Zucker Hillside Hospital», Associate Professor of Psychiatry and Molecular Medicine at the Donald and Barbara Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell, New York, USA

Α. Πολίτης

Ψυχίατρος

Δ. Ρούκας

Στρατιωτικός Ψυχίατρος

Ν. Σμυρνής

Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

Α. Σπυροπούλου

Ψυχίατρος, Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Ν. Στεφανής

Καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

Δ. Στογιόγλου

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Επιμελητής Ψυχιατρικής Κλινικής 251 Γ.Ν.Α.

Π. Σφηκάκης

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής & Μονάδος Ρευματολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α.

Χ. Τουλούμης

Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής, 5^ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών «Ψ.Ν.Α.»

Π. Φερεντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Υπεύθυνος Μονάδας Συναισθηματικών Διαταραχών και Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς, Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Ι. Χατζημανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.Ψ.Υ)

Ρ. Ψαράς

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Πρόεδρος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Κλάδος Νέων Ψυχιάτρων

7^ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΩΡΙΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Με την ευγενική χορηγία των εταιρειών



Specifar
A Teva Company



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 7^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (με Διεθνή Συμμετοχή) πραγματοποιείται στην Αναργύρειο και Κοργιαλένιο Σχολή Σπετσών, στις Σπέτσες από 12 - 15 Απριλίου 2018.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Καθ'ολη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Γραμματεία στην Αναργύρειο και Κοργιαλένιο Σχολή

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο φαρμακευτικό χώρο.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (BADGES)

Οι κάρτες συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Στην είσοδο της αίθουσας θα υπάρχει σύστημα barcode.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παραλαβή της βεβαίωσης παρακολούθησης, με βάση την εγκύκλιο του ΕΟΦ, απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. Η βεβαίωση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (CME)


Το Συνέδριο αξιολογείται με 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αμοιβαίως αναγνωρίσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτουργεί κέντρο παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων στη Γραμματεία έξω από τη Κεντρική Αίθουσα Εκπαίδευσης. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν σε αυτό το χώρο το υλικό των εισηγήσεων τους (USBs, CDs) τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της ομιλίας τους.


Προβλέπονται τα εξής Οπτικοακουστικά Μέσα:

- Η/Υ ,Office 2010
- Data video Projector (Power Point Presentation).



ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ:

**ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΥ
ΑΞΙΖΕΙ**



ZYPAdhera

Olanzapine Powder and Solvent for
Prolonged Release Suspension for Injection



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά ΤΗΛ.: 210 6294600 Fax: 210 6294610, Τ.Θ. 51288
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629 Fax: 210 6294630 e-mail: orders@lilly.gr www.lilly.gr

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ZYPADHERA 210 mg, 300 mg και 405 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναντήρισμα παρατεταμένης αποδέσμευσης. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε φιαλίδιο περιέχει παρόμοιο μονοκονικό ολαναζίνη 150mg και με 210 mg, 300 mg ή 405 mg ολαναζίνης αντιστοίχα. Μετά την ανασύστασή του, 1ml εναιωρήματος περιέχει 150 mg ολαναζίνη. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Για τη θεραπεία συντήρησης ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια οι οποίοι είχαν σταθεροποιηθεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της οξείας θεραπείας με από του στόματος ολαναζίνη. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης** Το ZYPADHERA 210mg, 300mg και 405mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναντήρισμα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεν πρέπει να συγχέεται με την ολαναζίνη 10 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. **Δοσολογία:** Οι ασθενείς, αρχικά θα πρέπει να έχουν λάβει από του στόματος ολαναζίνη πριν τη χορήγηση του ZYPADHERA, για να επιτευχθεί ανεκτικότητα και ανταπόκριση. Για να προσδιοριστεί η πρώτη δόση ZYPADHERA για όλους τους ασθενείς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το δοσολογικό σχήμα στον Πίνακα 1. Συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα και συσχέτιση της από του στόματος χορηγούμενης ολαναζίνης και του ZYPADHERA

Προσαρμογή της δόσης: Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία υποτροπής κατά τη διάρκεια του πρώτου ενός έως δύο μηνών θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της αντιψυχωφάνιας θεραπείας, η βελτίωση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η δόση μπορεί να δοσθεί να προσαρμόζεται με βάση την κλινική κατάσταση του κάθε ασθενή. Μετά την κλινική επανοξιολόγηση, η δόση μπορεί να ρυθμιστεί με εύρος δόσεων από 150 mg έως 300 mg κάθε 2 εβδομάδες ή από 300 mg έως 405 mg κάθε 4 εβδομάδες (Πίνακας 1). **Συμπτωματική χορήγηση** με από του στόματος ολανζαπίνη δεν εγκρίθηκε σε διπλές-τυφλές κλινικές μελέτες. Εάν η συμπτωματική χορήγηση με από του στόματος ολανζαπίνη ενδείκνυται κλινικά, τότε η συνδυασμένη συνολική δόση ολανζαπίνης θα από τις δύο μορφές δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη μέγιστη δόση της από του στόματος ολανζαπίνης των 20 mg/ημερίως. Η χορήγηση του ZYPADHERA δε συνιστάται σε ασθενείς >75 ετών. Μια μικρότερη δόση έναρξης (150 mg κάθε 4 εβδομάδες) θα πρέπει να εξεταστεί για αυτούς τους ασθενείς. **Παράρτημα: Πληθυσμός:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του ZYPADHERA σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Το ήδη υπάρχοντα διαθέσιμο δεδομένο περιγράφεται παρακάτω, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει καμία σύσταση δοσολογίας. **Τρόπος χορήγησης ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: ΝΑ ΜΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΦΘΕΒΙΑ Η ΥΠΟΔΟΡΙΑ** από επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένοι στην κατάλληλη τεχνική ένεσης και σε χώρους όπου η παρακολούθηση μετά την ένεση και η παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας μπορούν να παρασχεθούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας. Μετά από κάθε ένεση, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από κατάλληλη ειδικευμένο προσωπικό για τουλάχιστον 3 ώρες για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας από ολανζαπίνη. Αμέσως πριν από την ένεση από τους χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, πνευματικά προσαρμοσμένος και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, θα πρέπει να συνεχιστεί η στενή ιατρική επίβλεψη και παρακολούθηση μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέρθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. **Αντενδείξεις:** Υπερτασθμία στη δραστησία ουρίας ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. **Είδους προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Πρέπει να λαμβάνονται ειδική προσοχή στην εφαρμογή της κατάλληλης τεχνικής ένεσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η από αμέλεια ενδοαγγειακή ή υποδόρια ένεση. **Σύνδρομο μετά από ένεση** Κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, αντιδράσεις με σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με υπερδοσολογία ολανζαπίνης παρουσιάστηκαν σε ασθενείς μετά από ένεση με ZYPADHERA. Οι αντιδράσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε ποσοστό < 0.1% των ενέσεων και σε περίπου 2% των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα καταστολής (που κυμαίνονταν από μέτρια σε σοβαρότητα έως και κόπωση/καύση/παράληψη/ [που περιλάμβανε σύγχυση, αποπροσανατολισμό, διέγερση, άγχος και άλλη νοσητή δυσλειτουργία). Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξουπνισμικά συμπτώματα, δυσαρθρία, στασία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αρχικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίδοξη από εμφάνισαν μέσα σε 1 ώρα μετά από την ένεση και σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρθηκε πλήρης ανάρρωση μέσα σε 24-72 ώρες μετά από την ένεση. Αυτές οι αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σπάνια (< 1 για κάθε 1.000 ενέσεις) εντός των 1-3 πρώτων ωρών και πολύ σπάνια (< 1 για κάθε 10.000 ενέσεις) μετά τις 3 ώρες. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για αυτόν τον πιθανό κίνδυνο και την ανάγκη να παρακολουθούνται για 3 ώρες σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών κάθε φορά που τους χορηγείται ZYPADHERA. Μετά από κάθε ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται σε χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από κατάλληλη ειδικευμένο προσωπικό για τουλάχιστον 3 ώρες για σημεία και συμπτώματα σχετιζόμενα με υπερδοσολογία ολανζαπίνης. Αμέσως πριν από την ένεση του ασθενή από τους χώρους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής είναι σε ετοιμότητα, έχει διάθεση προσαρμοσμού και δεν παρουσιάζει σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας. Εάν υπάρχει υποψία υπερδοσολογίας, η στενή ιατρική επίβλεψη και η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστούν μέχρι η εξέταση να δείξει ότι τα σημεία και τα συμπτώματα έχουν παρέρθει. Για τους ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα σχετιζόμενα με την υπερδοσολογία ολανζαπίνης το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 3 ωρών θα πρέπει να παραταθεί όπως κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Για το υπόλοιπο της ημέρας μετά από την ένεση, οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ανάλογα, για να είναι σε επαγρυπνήση για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας δευτερογενώς των μετά την ένεση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών, να είναι σε θέση να ζητήσουν βοήθεια εάν χρειαστεί και να μην οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές, συστήματα προσεκτική αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης για την αποφυγή υπερβολικής καταστολής και καρδιοαναπνευστικής καταστολής εάν παρεντερικές χορηγούμενες βενδοζιμίνες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των μετά την ένεση ανεπιθύμητων ενεργειών. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** σχετιζόμενες με το σημείο της ένεσης: Η συνθεστέρα αναφερόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο της ένεσης ήταν το άλγος. Η πλειοψηφία των αντιδράσεων αναφέρθηκαν από "όπως έως μέτριας" σοβαρότητας. Στην περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με το σημείο της ένεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα περιστατικά. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Περιληψία** δεδομένων ασφαλείας: **Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί με την παγκόσμια ολανζαπίνη** Περιστατικά συνδρόμου μετά την ένεση έχουν παρουσιαστεί με τη χορήγηση του ZYPADHERA και οδηγούν σε συμπτώματα σχετιζόμενα με υπερδοσολογία με ολανζαπίνη. Άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν περιλάμβαναν εξουπνισμικά συμπτώματα, δυσαρθρία, στασία, επιθετικότητα, ζάλη, αδυναμία, υπέρταση και σπασμούς. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν ZYPADHERA (πριν παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς που λάμβαναν από του στόματος ολανζαπίνη. Σε

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την
« ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ »





7⁰

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ONE TO ONE A.E.



Νίκης 16, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 2107254383-385-386
Fax: 2107254384
Email: info@one2onesa.com
<http://www.onetoone-congress.com>
 [onetoonecongress](https://www.facebook.com/onetoonecongress)

Το Brintellix ενδείκνυται
για την αντιμετώπιση
των μεζόνων καταθλιπτικών
επεισοδίων σε ενήλικες

Οι ασθενείς αισθάνονται, σκέφτονται
και λειτουργούν καλύτερα ¹⁻⁷

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου:
Lundbeck Hellas S.A. Κρωσσίας 109 & Σίνα 15124, Μαρούσι, Αθήνα. Τηλ: +30 2106105036